



POLLO PARRILLERO INICIADOR 23 - TROPERO



Código: FT-SGC-02/10

Revisión: 00

Vigencia: 13/06/2021

MARCA: TROPERO **DENOMINACIÓN TÉCNICA:** Alimento balanceado. **Nº DE HABILITACIÓN SENASA:** 21051/A **ELABORADO Y COMERCIALIZADO POR:** GRUPO CAMPO SA

ORIGEN: Industria Argentina. **DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:** Lote 33/34 – Parque Industrial Gualeguaychú – Entre Ríos **FORMAS DE PRESENTACIÓN:** bolsas de 30 kg. **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:** Pellet de 4.5 a 6 mm de diámetro, de color beige y olor característico, quebrantado.

Composición centesimal

Proteína bruta (mínimo)	23	%
Materia Grasa (mínimo)	3,00	%
Fibra cruda (mínimo)	3,50	%
Minerales totales (mínimo)	2,00	%
Humedad (máximo)	12	%
Calcio (mínimo- máximo)	1,0- 1,8	%
Fósforo (mínimo- máximo)	0,5- 1,0	%
Energía metabolizable mínima	3300	Kcal/kg

Materias primas

Maíz, Expeller de soja, Harina de conchilla (suplemento mineral - carbonato de calcio), sal (cloruro de sodio), fosfato monocalcico y Suplemento vitamínico (Vitaminas A (acetato de), D3 (Colecalciferol), E (acetato de), K3 (bisulfito de Menadiona), B1 (Tiamina), B2 (Rivoflavina), B6 (Piridoxina), B12 (Cianocobalamina), Ác. D – pantotenato de calcio, Ác. Nicotínico, Ác. Fólico, Colina (Cloruro de) - mineral (cobalto (sulfato de cobalto heptahidrato), cobre (sulfato de cobre monohidratado), hierro (sulfato ferroso monohidratado), manganeso (óxido de), selenio (selenito de sodio anhidro), yodo (yodato de potasio), zinc (óxido de), Oxibendazole al 10% Pfizer, Ácido 3 Nitro), antioxidante (Endox).

Indicaciones de uso

Suministrar el alimento a discreción.
Desde el nacimiento hasta los 28 días de vida.

Las recomendaciones y dosis son siempre orientativas.
Consultar en todos los casos con el profesional veterinario actuante

Especie y categoría a las que se destina: Alimento completo para suministrar a pollos parrilleros desde el nacimiento hasta los 28 días de vida.

Condiciones y plazo de conservación:

Conservar un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz solar, a temperatura no superior a 25 °C.
Período de conservación: 4 meses a partir de la fecha de elaboración

Restricciones de uso y contraindicaciones:

No suministrar a gallinas ponedoras ni a ningún otro animal específicamente autorizado

