



GALLINA PONEDORA DOMESTICA 17 - TROPERO



Código: FT-SGC-02/09

Revisión: 00

Vigencia: 13/06/2021

MARCA: TROPERO	DENOMINACIÓN TÉCNICA: Alimento terminado para aves Ponedora Alta Postura.	Nº DE HABILITACIÓN SENASA: 8632/A/E	ELABORADO Y COMERCIALIZADO POR: GRUPO CAMPO SA
ORIGEN: Industria Argentina.	DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Lote 33/34 – Parque Industrial Gualeguaychú – Entre Ríos	FORMAS DE PRESENTACIÓN: bolsas de 30 kg.	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Pellet de 4.5 a 6 mm de diámetro, de color beige y olor característico.

Composición centesimal

Proteína bruta (mínimo)	16	%
Materia Grasa (mínimo)	4,0	%
Fibra cruda (mínimo)	4,0	%
Minerales totales (mínimo)	3,0	%
Humedad (máximo)	12	%
Calcio (mínimo- máximo)	1,0 - 3,0	%
Fósforo (mínimo - máximo)	0,3 - 0,5	%
Energía metabolizable mínima	3000	Kcal/kg

Materias primas

Maíz, Expeller de soja, Harina de conchilla (suplemento mineral - carbonato de calcio), sal (cloruro de sodio), fosfato monocálcico y Suplemento vitamínico (Vitaminas A (acetato de), D3 (Colecalciferol), E (acetato de), K3 (bisulfito de Menadiona), B1 (Tiamina), B2 (Rivoflavina), B6 (Piridoxina), B12 (Cianocobalamina), Ác. D – pantotenato de calcio, Ác. Nicotínico, Ác. Fólico, Colina (Cloruro de) - mineral (cobalto (sulfato de cobalto heptahidrato), cobre (sulfato de cobre monohidratado), hierro (sulfato ferroso monohidratado), manganeso (óxido de), selenio (selenito de sodio anhidro), yodo (yodato de potasio), zinc (óxido de), Oxibendazole al 10% Pfizer), antioxidante (Endox)..

Indicaciones de uso

Gallina ponedora desde el 5% de postura hasta el fin de su vida productiva. Suministrar el alimento a discreción

Las recomendaciones y dosis son siempre orientativas. Consultar en todos los casos con el profesional veterinario actuante

Ventajas del alimento: Su forma, tamaño y sabor del pellet, a partir de las materias primas, permiten una mejor asimilación y absorción, mejorando el aporte nutricional inmediatamente.

Condiciones y plazo de conservación:

Conservar un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz solar, a temperatura no superior a 25 °C.
Período de conservación: 4 meses a partir de la fecha de elaboración

Restricciones de uso y contraindicaciones:

No suministrar a pollos parrilleros iniciador ni a ningún otro animal específicamente autorizado.

