



TERNERO 18 - TROPERO



Código: FT-VAC-02/24
Revisión: 00
Vigencia: 13/09/2024

MARCA: TROPERO	DENOMINACIÓN TÉCNICA: Alimento Balanceado completo con medicamento	Nº DE HABILITACIÓN SENASA: 17-654/A	ELABORADO Y COMERCIALIZADO POR: GRUPO CAMPO S.A.
ORIGEN: Industria Argentina.	DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Lote 33/34 – Parque Industrial Gualeguaychú – Entre Ríos	FORMAS DE PRESENTACIÓN: bolsas de 30 kg - 500 kg - 1000 kg y granel.	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Pellet de 4.5 a 6 mm de diámetro, de color beige - verde y olor característico.

Composición centesimal

Proteína bruta (mínimo)	18,00	%
Materia Grasa (mínimo)	4,00	%
Fibra cruda (mínimo)	5,50	%
Minerales totales (mínimo)	8,00	%
Humedad (máximo)	12,00	%
Calcio (mínimo - máximo)	0,75- 1,00	%
Fósforo (mínimo - máximo)	0,50- 0,80	%
Energía metabolizable mínima	2900	Kcal/kg

Materias primas

Maíz, Expeller de Soja, Pellets de trigo, Carbonato de calcio, Cloruro de sodio, Secuestrante de Micotoxinas (Silice, Oxido de Aluminio, Oxido de Magnesio, Oxido de Calcio, Oxido De Potasio, Oxido de Sodio, Humedad), Suplemento vitamínico (Vitaminas A, D3, E) y mineral (Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Yodo, Selenio, Cobalto). Monensina

Indicaciones de uso

Se utiliza en terneros a partir de los 130kg diariamente entre el 1% y 3% del peso vivo del animal. Este alimento contiene todas las vitaminas y minerales, para lograr un desarrollo y crecimiento armónico. Con este producto podemos lograr un crecimiento entre 20 kg y 30 kg mensuales. Dependiendo de la cantidad suministrada y el tipo de engorde a pastura o corral. Dieta sugerida hasta los 200kg.

Las recomendaciones y dosis son siempre orientativas.

Consultar en todos los casos con el profesional veterinario actuante

Especie y categoría a las que se destina: Destinado a Bovinos y ovinos. Su forma permite un mejor mezclado para el armado de la ración debido a la calidad y estandarización de las materias primas y la forma del tamaño del pellets.

Condiciones y plazo de conservación:

Conservar un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz solar, a temperatura no superior a 25 °C.
Período de conservación: 4 meses a partir de la fecha de elaboración

Restricciones de uso y contraindicaciones:

No usar en equinos, ni en aves reproductoras o ponedoras comerciales, ni en cerdos.

